

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Кларидол

Торговое наименование: Кларидол

Международное непатентованное название: Лоратадин

Химическое наименование: 4-(8-хлор-5,6-дигидро-1H-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-b] пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбоновой кислоты этиловый эфир.

Лекарственная форма: таблетки.

Активное вещество (мг/таб):

лоратадин 10 мг;

Вспомогательные вещества (мг/таб):

микrokристаллическая целлюлоза - 56,

крахмал - 25,

натрия метилпарабен – 0,2,

коллоидальный кремния диоксид безводный - 0,2,

магния стеарат – 0,8,

натрия крахмал гликолат - 2,

тальк очищенный – 0,8,

очищенная вода – сколько потребуется.

Фармакотерапевтическая группа: H₁-гистаминовых рецепторов блокатор.

Показания для применения:

Для взрослых и детей старше 2-х лет Кларидол применяется для лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринитов, конъюнктивита, поллиноза, крапивницы, в том числе хронической идиопатической крапивницы, отека Квинке, псевдоаллергических реакций, зудящих дерматозов, аллергических реакций на укусы насекомых.

Противопоказания для применения:

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Режим дозирования и способ применения:

Применяется внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет: по 10 мг Кларидола (1 таблетка) 1 раз в день. Суточная доза – 10 мг.

Детям от 2-х лет до 12 лет – по 5 мг Кларидола (1/2 таблетки) 1 раз в день. Суточная доза – 5 мг.

Детям с массой тела более 30 кг – по 10 мг Кларидола (1 таблетка) 1 раз в день. Суточная доза – 10 мг.

Меры предосторожности:

Больным с нарушениями функций печени Кларидол необходимо назначать в начальной дозе 5 мг в день в связи с возможным нарушением клиренса лоратадина.

Не рекомендуется детям до 2-х лет.

Симптомы передозировки: сонливость, тахикардия, головная боль. В случае передозировки следует обратиться к врачу и принять меры по ускорению выведения препарата из желудочно-кишечного тракта и снижению абсорбции.

Возможные побочные действия:

Редко – сухость во рту, тошнота, рвота, гастрит, нарушение функции печени, головная боль, повышенная утомляемость, возбудимость (у детей), головокружение, кашель, тахикардия, аллергические реакции. В отдельных случаях – алопеция.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

При использовании лоратадина в терапевтических дозах не выявлено его взаимодействия с алкоголем. Эритромицин, циметидин, кетоконазол при

совместном применении с лоратадином увеличивают концентрацию лоратадина в плазме крови, не вызывая клинических проявлений и не влияя на ЭКГ.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Следует воздержаться от применения Кларидола при беременности и лактации.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Кларидол не вызывает сонливости и не влияет на психомоторные функции, внимание, работоспособность, умственные способности.

Срок годности: 3 года. Не использовать препарат после истечения указанного срока годности.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта врача.

Производитель:

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.», Индия

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.), Мумбай – 400 099.

Претензии потребителя направлять по адресу представительства:

111033 Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

тел.: (495) 970-15-80